

A konyhasó helyett étkezési sóként ajánlott patkányméreg kálisóval fajirtás hazai megszervezésének lépései

1. Régen köztudott volt a tengervíz bepárlásánál vagy a sóbányákban a konyhasóra rárétegződő, ugyancsak sós, de kellemetlen ízű kálisó népiirtó hatása. Emiatt már az **Aranybulla** keletkezése idején (1222) is megbízható, nem izraelita és nem izmaelita nemzeti „sókamárások” vigyáztak az étkezési célra árusított konyhasó tisztaságára, veszélytelenségére, kálisó mentességére. A kálisó vidéken még ma is, mint hatékony patkányirtó szer ismert

2. 1950-ben Nobel-díjat kapott külföldi kutatók konkrét (nátrium- és kálium dózis variációs) hatás méréseikkel patkányoknál és embereknél is bebizonyították a hiányos étkezési konyhasó pótlás és a kálium túladagolás vese- és mellékvese tönkretevő, **magas vérnyomást**, elbutilást, izomgyengülést, szív működési- és keringési zavarokat, daganatokat, rákbetegséget és **nemi torzulásokat** (pszeudohermafroditizmust) is előidéző, vagyis **fajirtó** hatásait.

3. Egy **Lewish Dahl** nevű külföldi kutató elhitette, hogy a „túl sok konyhasóval” szózott étel magas vérnyomást idézett elő a patkányoknál. Azóta világszerte híresztelik, hogy az étkezési konyhasó használat csökkentése az időskori magas vérnyomás legkiválóbb ellenszere. A híresztelést annak ellenére is folytatják, hogy a patkányoknál magas vérnyomást okozó „túl sok konyhasóról” kiderült, hogy emberre helyesen átszámítva: **napi fél kilogramm!**

4. Az ENSZ Egészségügyi Világ Szervezete, a WHO 1982-ben közzétette, hogy a gyermekétkeztetésben teljesen is helyettesíthető kálisóval a konyhasó.

5. Az Országos Élelmezés és Táplálkozás Tudományi Intézet (**OÉTI**) hazai klinikákon mérte (1985) a konyhasó helyett kálisóval sózás emberek veseműködésére és szív működésére gyakorolt hatását is, a 99%-ban kálisóból álló „Redi só” engedélyezési kísérleteként. Beigazolódott a mindenkinél vizeletkiválasztást felére csökkentő hatása az éhgyomorra, fél liter vízben oldva 1 grammnál több kálium szájon át bejuttatásának (a kálisó nélküli oldat iváshoz képest), s a 2 grammnál több kálium szív működés rontó hatása is: **5 mval/liter** fölé növelte a vérszérum-káliumot!

6. Miután így bebizonyosodott a 0,88 gramm kálium (2 gramm **REDI SÓ**) szájon át bejuttatásának mindenkinél vesemérgező hatása, miniszteri szintről is elhíresztelték a sok százszor ennyi kálium egészséges veséjű emberekre veszélytelenségét. Dr. Surján László miniszter például azt írta nekem, hogy csak napi 70 grammnál több kálium (a napi 133 grammnál több kálisóval sózás) mérgező. Vele, majd a nyomozó rendőrséggel, az OÉTI vezetője közölte.

7. Az **OÉTI** engedélyezte a 99% káliumsó tartalmú **REDI SÓ** gyógyszerárakban, „gyógytápszerként” árusítását.

8. A gyógyszerárak elkezdtek orvosi rendelvény nélkül is gyógytápszerként árusítani étkezési célra a Redi sót.

9. Az étkezési só elnevezést, ami korábban csak a legalább 97% nátrium-kloridot tartalmazó konyhasóra vonatkozott, lásd az MSZ-01-10007/82. korábbi, még jó étkezési só szabványt, „átértelmezték” a kálisóra is.

10. A Magyar Élelmiszertörvénybe (1995. évi XC. törvény) is beírták a „csökkentett nátriumtartalmú só” és „nátriummentes étkezési só” elnevezést, megengedve a kálisót tartalmazó szabványsértő étkezési sók árusítását is.

11. A hazai országgyűlésben három miniszter, **Surján László, Gergátz Elemér és Keresztes K.Sándor**, letagadták az OÉTI klinikai hatásmérési kísérletei Redi Só mérgezőség bizonyító eredményeit (**8253.** számú interpellációs válasz, **1992. december 8.**). Azóta a rádiók, televíziók, újságok **felbízgatnak** a „kálisóval sózásra”.

12. Mindenféle cégek elkezdtek gyógyhatású étkezési sóként reklámozni és árusítani a kálisóval kevert konyhasót, a **Sara Lee**, **Compact Douwe Egberst**, **Norbi Update**, **Horváth Rozi** reklámos, **Vivega**, **Bad Ischler**, **Nyírtassi**, **Bonosal**, **Bonsalt** (utóbbit „**kóser tanúsítvánnyal**” árusítják az interneten!) stb., életrövidítő, ivartalanító „sókat”.

13. Nemrég úgy módosították a kálisót valamennyi étkezési sóban tiltó magyar szabványt (**MSZ-01-10007/82**), hogy az arra nem hivatkozó étkezési sókban akármennyi kálisó lehessen, tehát ez által is „legalizálták” a fajirtást.

14. Módosították a nátrium és kálium határértékeket, hogy a laboratóriumok ne mutassák ki a mérgezést.

A vonatkozó bizonyítékokat lásd a www.tejfalussy.com és az azon belül működő www.aqunet.fw.hu honlapon!

Verőce, 2016. december 31. Jogos védelem (**Btk.**) és megbízás nélküli kárelhárítás (**Ptk.**) keretében közzéteszi:

Tejfalussy András oknyomozó mérnök feltaláló,
volt országgyűlési szakértő (www.tejfalussy.com)

(Iratjel: kalisovalfajirtasszervezeslepesei161231j)